

## HEMLIBRA

<b>NOM COMMERCIAL</b>	Hemlibra (émicizumab injectable)
<b>COMPOSITION</b>	Aucun agent de conservation <b>Ingrédients non médicinaux cliniquement significatifs :</b> L-arginine, acide L-aspartique, L-histidine, poloxamère 188 et eau pour injection
<b>ALTERNATIVES</b>	<b>Produit non sanguin :</b> NiaSTASE, FEIBA <b>Produit sanguin :</b> s. o.
<b>POSOLOGIE</b>	Dose recommandée de 3mg/kg une fois par semaine pendant les 4 premières semaines. Dose de 1,5mg/kg une fois par semaine par la suite. <b>Consulter la monographie du produit établie par le fabricant pour les détails concernant la posologie relative à chaque indication.</b>
<b>ADMINISTRATION</b>	Injection sous-cutanée uniquement <b>Solution en fioles :</b> 30 mg/1ml, 60 mg/0,4 ml (150 mg/ml) 105 mg/0,7ml (150 mg/ml) 150 mg/1ml <b>Consulter la monographie du produit établie par le fabricant pour les détails concernant la reconstitution.</b>
<b>INDICATIONS</b>	Indiqué en prophylaxie de routine pour prévenir les hémorragies ou réduire la fréquence des épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie A (déficiency congénitale en facteur VIII) présentant des inhibiteurs du facteur VIII
<b>CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES</b>	Le traitement par des agents court-circuitant l'activité des inhibiteurs du facteur VIII doit être arrêté le jour précédant l'instauration du traitement par Hemlibra. <b>(voir Mises en garde et précautions, Sang)</b>
<b>CONTRE-INDICATIONS</b>	Hypersensibilité à ce médicament ou à l'un des ingrédients de sa formulation, y compris les ingrédients non-médicinaux, ou à composant du contenant. Pour obtenir la liste complète, consulter la partie Formes posologiques, concentration, composition et conditionnement.
<b>ENTREPOSAGE</b>	Entreposer à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler, Ne pas agiter. Protéger de la lumière.
<b>RÉFÉRENCES</b>	Monographie du produit approuvée le 2 août 2018

HEMLIBRA

